

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Engerix-B Hepatitis B vakcina adásáról

Kedves Betegünk!

Az eljárás célja: Hepatitis B vírus fertőzés elleni aktív immunizálás. A vakcina nem véd hepatitis A és non -, non –B hepatitis vírusok okozta fertőzések ellen. Mivel a hepatitis D hepatitis B fertőzés nélkül nem jelenik meg, várható, hogy a hepatitis D is megelőzhető a védőoltás segítségével.

Az oltás ajánlott: egészségügyi dolgozók számára, olyan betegeknek, akik rendszeres vértranszfúzióban részesülnek, onkológiai betegek, sarlósejtes anémiában, májzsugorban, vérzékenységekben szenvedők, intézmények lakói és ápolói. Ajánlott azon személyeknek, akik szexuális tevékenységükből eredően fokozottan veszélyeztetettek, a kábítószerélvezők, erősen ferőzött területekre utazók, hepatitis B vírust hordozó anyák újszülöttjei, szervtranszplantációra váró betegek és bárki számára, aki munkája vagy személyes életvitele révén hepatitis B vírus fertőzésnek lehet kitéve.

Az eljárás technikája:

Az injekciót az izomba kell beadni, kivételesen bőr alá is beadható súlyos vérzékenységekben szenvedő betegek esetében. Az immunizálás 3 izomba beadott adagból áll:

1. Az első adag a választott időpontban
2. második adag 1 hónap múlva
3. harmadik adag 6 hónappal az első adag beadása után.

Az eljárás esetleges veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:

A vakcina bármely komponensével szembeni túlérzékenység, súlyos, lázas fertőzés esetén nem adható. A vakcina magzati fejlődésre gyakorolt hatása nem ismert, így terhes nők oltása általánosan nem ajánlott, de megfontolandó azon terhes nők esetében, akik a hepatitis B fertőzés fokozott veszélyének vannak kitéve.

Az oltás helyén kialakulhat múló fájdalom, bőrpír, beszűrődés az injekció helyén. Ritkán előfordulhat fáradtság, láz, rossz közérzet, influenza-szerű tünetek, szédülés, fejfájás, hányinger, hányás, hasmenés, hasi fájdalom, abnormális májfunkciós teszt eredmények, izomfájdalom, bőrkiütés, viszketés.. Nagyon ritkán kialakuló mellékhatások: anaphylaxiás reakció, alacsony vérnyomás, idegbántalmak, bénulások, agyvelő-, agyhártyagyulladás, ízületi gyulladások, érgyulladások, hörgőszűkület-szerű tünetek.

A beavatkozás elmaradásának veszélyei és más eljárási lehetőségek:

Hepatitis B fertőzés kialakulásának veszélye. A védőoltáson kívül a hepatitis B megelőzésének más lehetősége jelenleg nem áll rendelkezésre.