

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Pneumo 23 vakcina adásáról

Kedves Betegünk!

Az eljárás célja:

Elsősorban a vakcinában található szerotípusok okozta tüdőgyulladás megelőzésére javallott.

Az alábbi, 2 év feletti, fokozottan veszélyeztetett egyének számára a védőoltás adása javallott:

- 65 éven felülieknek, elsősorban intézeti elhelyezés esetén,
- olyan immunkompetens személyeknek, akik labilis egészségi állapotban vannak,
- akik gyakori kórházi kezelésre szorulnak (cukorbetegség, krónikus bronchitis, légzőszervi és szívelégtelenség, alkoholizmus ill. nikotinfüggőség fennállása,
- csökkent immunkészségű betegnél,
- osteo-meningealis lézió fennállása esetén

Az eljárás technikája:

A védőoltást izomba vagy bőr alá kell beadni. A vakcina bármely komponensével szembeni túlérzékenység esetén nem adható. Nem ismeretes, hogy a vakcina terheseknek adva okoz-e magzatkárosító hatást, vagy befolyásolja-e a reprodukciós képességet, ezért terheseknek csak olyan esetben adható, amennyiben ez kifejezetten szükséges. Nem ismeretes, hogy a vakcina kiválasztódik-e az emberi tejben. Óvatosság szükséges, ha a vakcinát szoptató anyának kell adni.

Az eljárás esetleges veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:

Gyakori mellékhatás a beadás helyén a fájdalom, bőrpír, keményedés, alkalmanként előfordulhat kismértékű láz. Ritkán előfordulhat fejfájás, láz, rossz közérzet, gyengeség, nyirokcsomó-duzzanat, túlérzékenységi reakció, izomfájdalom, ízületi gyulladás, bőrkkiütés.

A beavatkozás elmaradásának veszélyei és más eljárási lehetőségek:

A Hemophilus influenzae b típusa által okozott influenza megelőzésére a védőoltáson kívül más eljárás jelenleg nem ismeretes.